



Informacja o zasadach i miejscach odbioru tabletek jodku potasu na terenie gminy Śliwice

Dodane przez Tomasz Glaza - czw., 27/10/2022 - 08:18

PROFILAKTYKA JODOWA

BROSZURA INFORMACYJNA



W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku.

Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r. ż.: 1 tabletka (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r. ż.: ½ tabletki (25 mg jodu)
- noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)



Tagi

- Aktualności

Informujemy, że Gmina Śliwice przyjęła „**Plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzeń radiacyjnych**”. W związku z tym, prosimy Mieszkańców o zapoznanie się z **rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu**, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania.

Plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemniej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane za pośrednictwem mediów z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Śliwice.

ZASADY ODBIORU TABLETEK JODKU POTASU

1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
2. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Śliwice.
3. Wydawanie preparatów jest ewidencjonowane; wydanie preparatu jest jednorazowe.
4. Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych nie ma możliwości ich przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
5. Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
6. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będzie patrol interwencyjny Policji.
7. Próby pobrania preparatów jodowych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zgłaszane będą Policji.
8. **Osoby czasowo przebywające na terenie Gminy Śliwice (bez zameldowania na pobyt czasowy, w tym obcokrajowcy) zgłaszają się po odbiór tabletek do Urzędu Gminy w Śliwicach, ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30, Sala Narad.**

MIEJSCA DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU

Nazwa punktu dystrybucji	Mieszkańcy sołectw	Nazwa
GPWPJ NR 1	Śliwice, Byłyczek (Łoboda)	Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 39
GPWPJ NR 2	Śliwiczki, Laski (Zazdrość)	Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach, sala gimnastyczna, Śliwiczki 10
GPWPJ NR 3	Lińsk	Remiza Strażacka, Lińsk 49
GPWPJ NR 4	Rosochatka, Zwierzyniec (Główka)	Świetlica Wiejska, Rosochatka 21
GPWPJ NR 5	Krąg	Świetlica Wiejska, Krąg 27

GPWPJ NR 6	Łąski Piec	Świetlica Wiejska, Łąski Piec 40
GPWPJ NR 7	Brzeźno	Świetlica Wiejska, Brzeźno 17
GPWPJ NR 8	Okoniny	Świetlica Wiejska, Okoniny 28
GPWPJ NR 9	Linówek	Świetlica Wiejska, Linówek 14
GPWPJ NR 10	Lipowa	Świetlica Wiejska, Lipowa 4
GPWPJ NR 11	Lubocień	Świetlica Wiejska, Lubocień 40
GPWPJ NR 12	Okoniny Nadjeziorne, Brzozowe Błota	Salka przy Kościele, Okoniny Nadjeziorne 17
GPWPJ NR 13	Lisiny (Jabłonka, Kamionka)	Świetlica Wiejska, Lisiny 12

Wykaz grup wiekowych i dawkowanie

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE GRUP RYZYKA	SPOSÓB PODANIA
1	Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia	Jednorazowo 1/4 tabletki (12,5 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;
2	Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia	Jednorazowo 1/2 tabletki (25 mg jodu). Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podawanego pokarmu i podać dziecku;
3	Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat	Jednorazowo 1 tabletkę (50 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem. Tabletki można pokruszyć i dodać do chłodnego napoju;
4	Dzieci powyżej 12 lat i dorośli	Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem;
5	Kobiety w ciąży (każdy wiek)	Jednorazowo 2 tabletki (100 mg jodu). Tabletkę należy połknąć i popić wodą lub innym chłodnym napojem;

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Source URL:

<https://www.sliwice.pl/aktualnosc/aktualnosci/853-informacja-o-zasadach-i-miejscach-odbioru-tabletek-jodku-potasu-na>